

MALALTIA	TEMPS D'INCUBACIÓ	SÍMPTOMES	PERÍODE DE CONTAGI	MESURES PREVENTIVES
-----------------	--------------------------	------------------	---------------------------	----------------------------

CONJUNTIVITIS BACTERIANA	D'1 A 5 DIES	Llagrimeig, irritació i congestió d'ulls. Fotòfobia i inflamació de la parpella	Fins que no s'acaba el tractament.	No anar a l'escola ni tampoc a la piscina. S'aconsella la higiene personal i d'objectes.
ESCARLATINA	D'1 A 4 DIES	Febre, Erupció cutània, Angines inflamades	1 o 2 dies amb tractament i de 10 a 20 dies sense tractament.	No anar a l'escola fins al cap de 2 dies d'haver iniciat el tractament. Higiene personal i d'objectes.
GRIP	D'1 A 4 DIES	Febre, mal de cap, Malestar general, mal de coll, tos	3 dies a partir de l'inici dels símptomes.	No anar a l'escola. Vacunar els grups de risc.
LÀMBLIES	D'1 A 4 DIES	Diàrrea crònica, Còlics, Constipació intermitent	Fins a finalitzar el tractament.	No assistir a l'escola fins a finalitzar el tractament. Higiene personal i d'objectes
REFREDAT	DE 12H A 6 DIES	Llagrimeig, Estrnuts, Malestar	Fins a 5 dies després de l'aparició dels símptomes.	Pot anar a l'escola si no té malestar o febre.

RUBÈOLA O ROSA	DE 15 A 20 DIES	Febre i refredat, Erupció cutània, Inflamació dels ganglis de darrere l'orella	Fins a 4 dies després de l'aparició de l'erupció.	No assistir a l'escola fins que acaba l'erupció. Evitar el contacte amb les dones embarassades que no hagin passat la malaltia. Vacunació antirubèola.
XARAMPIÓ	10 DIES APROXIMADAMENT	Febre, Taques vermelles al coll, la cara i el cos	Fins a 5 dies després de l'aparició de les taques.	No anar a l'escola fins que desapareguin les taques. Vacunació antixarampió.
VARICEL·LA	DE 7 A 13 DIES	Febre, Cansament, Erupció vesiculosa (butllofes) a la cara, cos i extremitats	Fins que cau l'última costra de les vesícules.	No anar a l'escola fins que desapareguin les crostes. Evitar el contacte amb les dones embarassades que no hagin passat la malaltia.
POLLS	UNS 15 DIES UN COP DE LA IMPLANTACIÓ DELS OUS	Picor i visualització directa de les llèmenes o paràsits	Fins a l'eliminació dels paràsits.	No anar a l'escola. Higiene i control dels cabells. No cal utilitzar xampús ni colònies específiques.
TOS FERINA	D'1 A 2 SETMANES	Refredat, Tos seca, Vòmits	Des de 10 dies abans del primer símptoma fins a una setmana després d'haver passat el punt crític de la malaltia.	No anar a l'escola fins que no hagi desaparegut del tot.